

# 新北市新店區公所統計通報

新店區公所會計室


112 年 6 月

## 111 年主要癌症死亡原因概況及性別統計分析

### 一、主要癌症死亡原因以氣管、支氣管和肺癌為首

111 年主要癌症死亡原因人數 668 人，較 110 年 658 人增加 10 人，死亡率為每十萬人口 223.3 人，較 110 年 218.2 人增加 5.1 人，死亡原因中以氣管、支氣管和肺癌 127 人最多，順位第二、三名分別為結腸、直腸和肛門癌 96 人及女性乳癌 39 人，上項前三順位死亡人數占所有主要癌症死亡人數 39.22%(詳表一)。

111 年本區前十順位主要癌症死亡原因人數占總死亡人數 74.40%，分別為(1)氣管、支氣管和肺癌、(2)結腸、直腸和肛門癌、(3)女性乳癌、(4)肝和肝內膽管癌、(5)胰臟癌、(6)前列腺(攝護腺)癌、(7)口腔癌、(8)胃癌、(9)非何杰金氏淋巴瘤、(10)子宮體癌(詳圖一)。



圖一 新店區前十順位主要癌症死亡原因

資料來源：衛生福利部

與 110 年比較，主要癌症死亡原因順位，原本未入前十大順位之非何杰金氏淋巴瘤排名第 11 位，其餘死亡原因皆在十名之內，僅順位變動。

按每十萬人口死亡率觀察，較 110 年增加者計有 3 項，分別為結腸、直腸和肛門癌、胰臟癌、口腔癌；下降者計有 5 項，分別為氣管、支氣管和肺癌、女性乳癌、肝和肝內膽管癌、前列腺(攝護腺)癌、胃癌。

表一、新店區主要癌症死亡原因概況2年比較

順位	死亡原因	111年			順位	死亡原因	110年		
		死亡人數	每十萬人口				死亡人數	每十萬人口	
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率
1	氣管、支氣管和肺癌	127	42.5	18.8	1	氣管、支氣管和肺癌	132	43.8	19.6
2	結腸、直腸和肛門癌	96	32.1	14.7	2	女性乳癌	52	33.1	16.7
3	女性乳癌	39	25.0	11.5	3	結腸、直腸和肛門癌	96	31.8	14.9
4	肝和肝內膽管癌	65	21.7	9.5	4	肝和肝內膽管癌	80	26.5	12.1
5	胰臟癌	50	16.7	7.3	5	前列腺(攝護腺)癌	27	18.7	7.8
6	前列腺(攝護腺)癌	20	14.0	6.0	6	胰臟癌	38	12.6	6.3
7	口腔癌	32	10.7	5.0	7	胃癌	37	12.3	5.0
8	胃癌	30	10.0	4.0	8	口腔癌	24	8.0	4.0
9	非何杰金氏淋巴瘤	26	8.7	3.5	9	食道癌	19	6.3	3.2
10	子宮體癌	12	7.7	3.6	10	白血病	18	6.0	3.0

資料來源：衛生福利部

## 二、主要癌症死亡原因男性為氣管、支氣管和肺癌為主，女性則以結腸、直腸和肛門癌為首


本區 111 年主要癌症死亡原因，男性以氣管、支氣管和肺癌 79 人最多，其次為結腸、直腸和肛門癌 48 人；女性以結腸、直腸和肛門癌及氣管、支氣管和肺癌並列最多，皆為 48 人，其次為女性乳癌 39 人(詳表二)。

整體而言，111 年主要癌症死亡原因，除氣管、支氣管和肺癌及結腸、直腸和肛門癌分別位居男女性一、二名外，其餘死亡原因因性別其順位有所不同(詳圖二)。

表二、新店區主要癌症死亡原因概況性別分析

順位	男性				順位	女性			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口			死亡原因	死亡人數	每十萬人口	
			死亡率	標準化死亡率				死亡率	標準化死亡率
1	氣管、支氣管和肺癌	79	55.1	26.6	1	結腸、直腸和肛門癌	48	30.8	13.7
2	結腸、直腸和肛門癌	48	33.5	16.2	2	氣管、支氣管和肺癌	48	30.8	12.9
3	肝和肝內膽管癌	47	32.8	16.0	3	女性乳癌	39	25.0	11.5
4	口腔癌	27	18.8	9.3	4	胰臟癌	27	17.3	7.0
5	胰臟癌	23	16.0	7.9	5	肝和肝內膽管癌	18	11.6	4.2
6	胃癌	20	14.0	6.1	6	子宮體癌	12	7.7	3.6
7	前列腺(攝護腺)癌	20	14.0	6.0	7	非何杰金氏淋巴瘤	12	7.7	2.8
8	食道癌	15	10.5	4.8	8	胃癌	10	6.4	2.3
9	鼻咽癌	14	9.8	5.9	9	卵巢癌	9	5.8	2.9
10	非何杰金氏淋巴瘤	14	9.8	4.5	10	白血病	8	5.1	2.9

資料來源：衛生福利部



圖二 新店區主要癌症死亡原因性別人數

資料來源：衛生福利部